

新型コロナワクチン

追加接種(4回目)のお知らせ(6月10日現在)

対象者 新型コロナワクチンの3回目接種から原則5カ月以上経過した①か②に該当する人(年齢は接種日時点)

① 60歳以上の人

② 18歳以上60歳未満で基礎疾患を有する人など

※基礎疾患を有する人の範囲については、接種券に同封する「基礎疾患等チェックシート」を確認の上、かかりつけ医へ相談してください。なお、かかりつけ医がない人は、接種会場での予診の際にご相談ください。

接種券の送付時期 3回目接種をした日から5カ月以上経過する18歳以上の全ての人へ、住民票所在地に順次接種券を発送しています。3回目接種から6カ月経過しても接種券が届かない人は、高梁市新型コロナワクチンコールセンターへお問い合わせください。

ただし、現時点では右記の接種対象者以外の人は接種ができませんのでご注意ください。また、今後対象者が変更となる場合がありますので、現時点で対象とならない人も接種券を大切に保管してください。

予約の受け付け 新型コロナワクチン接種には、事前予約が必要です。

① **早期予約** 接種券が届いていない場合でも、接種開始月の前月であれば定期受診の際に限り予約が可能です(医療機関が早期予約を認めている場合に限る)。なお、接種の際は接種済証をお持ちください。

※混雑回避のため、医療機関へ電話でのお問い合わせはお控えください。

② **通常の予約方法** 接種券と一緒に予約方法などの詳細を記載した用紙をお送りしますのでご確認ください。

ワクチンの種類 1〜3回目に接種したワクチンの種類に関わらず、ファイザー社ワクチン、または武田/モデルナ社ワクチンを使用します。

なお、間違い接種防止の観点から、各医療機関で取り扱うワクチンを指定していただきます。

接種の費用 無料(個人負担なし)

高梁市新型コロナワクチンコールセンター ☎ 21・0211



基礎疾患等
チェックシート

新型コロナワクチンの効果・安全性について

海外の研究では、3回目接種から4カ月以上経過した60歳以上の人にファイザー社ワクチンを4回目接種した場合、オミクロン株流行期において接種後6週間経過しても重症化予防効果が低下せず、維持されていたと報告されています。

また、別の海外の研究では、4回目接種後21日目までにおいて重大な副反応は認めなかったと報告されています。

出典: Bar-On YM et al. Protection by a Fourth Dose of BNT162b2 against Omicron in Israel. NEJM. 2022.

18歳以上の接種後21日目までに現れた症状

報告割合	ファイザー社・モデルナ社
50%以上	とうつう疼痛(78.8%)
10%~50%	けんたいかん倦怠感(33.2%)、筋肉痛(24.5%)、頭痛(21.5%)、こうけつしゅちよう硬結・腫脹(12.0%)
1~10%	かんせつ痛(8.4%)、37.5度以上の発熱(6.6%)、リンパ節腫脹(4.7%)、こうはんほっせき紅斑・発赤(8.0%)、知覚障害(1.5%)、アレルギー反応(1.0%)

※対象者 274人(ファイザー社製 154人、武田/モデルナ社製 120人)

出典: Gili Regev-Yochay et al. Efficacy of a Fourth Dose of Covid-19 mRNA Vaccine against Omicron. NEJM. 2022.